令和6年度　収穫適期のめやす【栃尾・山間部】　（8月18日までは本年値、それ以降は平均値(2014～2023)を使用）

気温データ：「気象庁 長岡(新潟県)2024年 日ごとデータ」を利用　JAえちご中越(越後ながおか地区版)

R6年出穂	出穂＼収穫	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4
	気温	25.2	25.1	25.0	24.9	24.8	24.7	24.6	24.5	24.4	24.3	24.2	24.0	23.8	23.7	23.5	23.3	23.1	22.8	22.6	22.4	22.2	22.0	21.7	21.5	21.3	21.2	21.0	20.8	20.6	20.4	20.1	19.9	19.7	19.5	19.2	19.0	18.8	18.6	18.3	18.1	17.9	17.7	17.5	17.3	17.1	16.9
	7月16日	933	958	983	1008	1033	1057	1082	1107																																						
	7月17日	909	934	959	984	1009	1033	1058	1082	1107																																					
	7月18日	882	907	932	957	982	1007	1031	1056	1080	1104																																				
ゆきみらい	7月19日	855	880	905	930	955	980	1004	1029	1053	1078	1102																																			
	7月20日	829	854	880	904	929	954	979	1003	1028	1052	1076	1100	1124																																	
✸	7月21日	801	826	851	876	901	926	950	975	999	1024	1048	1072	1096	1119																																
	7月22日			823	848	873	898	922	947	971	995	1020	1044	1067	1091	1115																															
	7月23日				819	844	869	893	918	942	966	991	1015	1038	1062	1086	1109																														
ゆきん子舞	7月24日					819	844	868	893	917	942	966	990	1014	1037	1061	1084	1107																													
	7月25日						818	842	867	891	916	940	964	988	1011	1035	1058	1081	1104	1126																											
	7月26日							815	839	864	888	912	936	960	984	1007	1031	1054	1076	1099	1121																										
✸	7月27日								811	835	860	884	908	932	955	979	1002	1025	1048	1071	1093	1115																									
✸こしいぶき	7月28日									808	832	857	881	904	928	951	975	998	1021	1043	1066	1088	1110	1131																							
こがねもち✸	7月29日										805	829	853	877	900	924	947	970	993	1016	1038	1060	1082	1104	1125																						
	7月30日											802	826	850	874	897	920	943	966	989	1011	1033	1055	1077	1099	1120																					
	7月31日												800	824	848	871	894	917	940	963	985	1007	1029	1051	1073	1094	1115																				
	8月1日														822	845	869	892	914	937	959	982	1004	1025	1047	1068	1089	1110	1131																		
	8月2日															818	841	864	887	910	932	954	976	998	1019	1041	1062	1083	1104	1124																	
	8月3日																813	836	859	881	904	926	948	970	991	1012	1034	1055	1075	1096	1116	1136	1156	1176	1196	1215	1234	1253	1271	1289	1308	1325	1343	1361	1378	1395	1412
	8月4日																	807	830	853	875	897	919	941	963	984	1005	1026	1047	1067	1088	1108	1128	1148	1167	1186	1205	1224	1243	1261	1279	1297	1315	1332	1350	1367	1384
✸コシヒカリ	8月5日																		803	825	848	870	892	914	935	956	978	999	1019	1040	1060	1080	1100	1120	1140	1159	1178	1197	1215	1233	1252	1269	1287	1305	1322	1339	1356
	8月6日																			800	823	845	867	888	910	931	952	973	994	1015	1035	1055	1075	1095	1114	1134	1153	1171	1190	1208	1226	1244	1262	1279	1297	1314	1331
	8月7日																					820	842	863	885	906	927	948	969	990	1010	1030	1050	1070	1089	1109	1128	1146	1165	1183	1201	1219	1237	1254	1272	1289	1306
✸ 新之助	8月8日																						816	837	859	880	901	922	943	964	984	1004	1024	1044	1063	1083	1102	1120	1139	1157	1175	1193	1211	1228	1246	1263	1280
	8月9日																							811	833	854	875	896	917	938	958	978	998	1018	1037	1056	1075	1094	1113	1131	1149	1167	1185	1202	1220	1237	1254
	8月10日																								807	829	850	871	892	912	932	953	973	992	1012	1031	1050	1069	1087	1106	1124	1142	1159	1177	1194	1211	1228
	8月11日																									802	824	845	865	886	906	926	946	966	986	1005	1024	1043	1061	1079	1098	1115	1133	1151	1168	1185	1202
	8月12日																											819	840	860	880	901	921	940	960	979	998	1017	1035	1054	1072	1090	1107	1125	1142	1159	1176
	8月13日																												812	833	853	873	893	913	932	952	971	989	1008	1026	1044	1062	1080	1098	1115	1132	1149
	8月14日																													807	827	847	867	887	906	926	945	963	982	1000	1018	1036	1054	1072	1089	1106	1123

収穫適期の目安（新潟県栽培指針・平年 ）

早生　925℃

こがねもち
コシヒカリ　1,000℃

早生品種は、高温気象のため収穫適期のめやすを平年より50℃程度(2日程度)早く刈取る。

ほ場差が大きいため、実際の収穫は籾の黄化割合で判断すること。

「収穫適期のめやす」を参考に、１穂籾と圃場ごとの籾の黄化状況（85～90%）を必ず確認し、刈り遅れないように注意しましょう。

※ ✸ は、出穂盛期を表す。(JAえちご中越調査)